

11. Über die Gruppen, deren Darstellungen sich sämtlich auf monomiale Gestalt transformieren lassen.

By Kiyosi TAKETA.

Mathematical Institute, Tokyo Imperial University.

(Rec. Feb. 6, 1930. Comm. by T. TAKAGI, M.I.A., Feb. 12, 1930.)

Von den Gruppen, deren Darstellungen sämtlich als monomiale geschrieben werden können, sind die Sätze bekannt:¹⁾

(1) Die Kommutatorgruppe einer Gruppe von obiger Eigenschaft ist eine eigentliche Untergruppe oder E .

(2) Gruppen, deren Ordnung eine Primzahlpotenz oder ein Produkt von lauter von einander verschiedenen Primzahlen ist, läßt sich stets auf monomiale Gestalt transformieren.

Diese erweiternd wollen wir beweisen:

(A) Jede Gruppe \mathfrak{G} von der Eigenschaft des Titels ist auflösbar.

(B) Ist \mathfrak{G} eine auflösbare Gruppe und \mathfrak{A} ihr Abelscher Normalteiler der Art, daß die Hauptreihe der Faktorgruppe $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ zugleich die Kompositionsreihe wird, so lassen sich sämtliche Darstellungen von \mathfrak{G} auf monomiale Gestalt transformieren.

(I) Da unser Satz (A) für alle Abelschen Gruppen gilt, kann man vollständige Induktion anwenden. Es gibt immer holomorphe Darstellung von \mathfrak{G} , wie z. B. die reguläre Permutationsgruppe. Sei Γ eine des niedrigsten Grades unter solchen. Γ kann monomial angenommen werden, und ersetzen wir alle Einheitswurzeln bei ihr durch 1, dann erhalten wir eine Darstellung Γ' von \mathfrak{G} durch Permutationen, die nicht mehr holomorph ist, weil sonst die Darstellung, die sich von Γ' durch die Wegnahme der identischen Darstellung ableiten lassen, gegen der Voraussetzung die holomorphe Darstellung von \mathfrak{G} werden müßte. Also bilden diejenigen Elemente von Γ , welche dem Einheitselement von Γ' entsprechen einen Abelschen Normalteiler \mathfrak{A} von \mathfrak{G} . Da jede Darstellung von $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ aber diejenige von \mathfrak{G} wird, kann sie auf monomiale Gestalt transformieren, folglich muß $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ auflösbar sein, denn sie ist von niedrigerer Ordnung als \mathfrak{G} . Damit ist auch unser Satz bewiesen.

(II) Die Umkehrung von (A) ist nicht immer richtig. Z. B. die

1) Vgl. A. Speiser, Theorie der Gruppen von endlicher Ordnung, Berlin (1923), 139-140.